



Haferwende 12 • 28357 Bremen

Dr. med. J.-W. Wittke
Dr. med. A. Gerritzen
Dr. med. H. D. Köster
Prof. Dr. med. W.-N. Kühn-Velten
PD Dr. med. K. Klingler

Fon 0421 2072 0
Fax 0421 2072 167
E-Mail info@mlhb.de
Internet <http://www.mlhb.de>

GLUKOSE-BELASTUNG INKL. INSULINBESTIMMUNG

1. Blutentnahme nüchtern (NaF-Blut und Serum)
2. Orale Gabe von 75 g Glukose in Wasser oder Tee
3. Blutentnahme – zur besseren Beurteilung sollte auch schon nach 30 min eine Blutentnahme erfolgen (NaF-Blut und Serum)
4. Blutentnahme nach 60 min (NaF und Serum)
5. Blutentnahme nach 120 min (NaF und Serum)

Bitte markieren Sie die **Röhrchen** entsprechend

0=nüchtern

30 min (falls diese Blutentnahme erfolgt)

60 min

120 min

Auf dem **Schein** (Mu 10) fordern Sie bitte folgendes an:

oGTT mit 75 g Glukose + Insulinbestimmung

wenn Sie auch das Hydroxyprogesteron bestimmt haben wollen, dann vermerken Sie bitte auf dem Schein auch noch **0:17OH-Progesteron** – dann wird dieser Wert in der Nüchternprobe gemessen.

Auf diese Weise angefordert, wird der Befund entsprechend kommentiert.